

**Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)**

**Taxonomi**

<b>Artsnavn (latinsk navn):</b>	Trichogaster leeri
<b>Populærnavn (dansk navn):</b>	Perle gurami, Perlemor gurami
<b>Familie (latin):</b>	Belontiidae
<b>Type:</b>	Ferskvand, Labyrintfisk
<b>Opdager (beskrevet af):</b>	Bleeker, 1852

**Førstegangso  
opdræt i DK:**

**Levested**

**Verdensdel:** Asien.

**Biotop  
(beskrivelse af  
regionen):**

**Udseende**

**Størrelse:** 12-13 cm.

**Form:** Aflang, slank krop med flotte finner der stråler ud i spidser.

**Farve:** Sort streg går fra snude og aftagende mod halepids. Krop og finner med masser af fine hvide prikker "diamanter" på både krop og finner, 2 lange føletråde der går ud fra bug, lige under hoved. Begge lidt mørkere på øverste halvdel af kroppen og lidt lysere på undersiden. Hannen: svagt rød/orange under hoved/bug og ud i starten bugfinne. Hannen får desuden længere ryg og gatfinne stråler end hunnen.

**Kønnsforskel:** Hannen har væsentligt flere farver end hunnen. Hunnen dog tykkere (pga. rogn)

**Varianter:**

**Behov**

**Dekorationer:** Bør gå i 100 liters akvarie eller mere. Elsker tætbeplantede akvarier med flydeplanter.

**Adfærd:** Fredelig, men hannen kan under redebygning, og pasning af rede og æg, jage de andre beboer væk fra "redeområdet"

**Social:** Holdes parvis eller en han til flere hunner. Holdes sammen med mindre, fredelige fisk.

**Foder:** Altædende.

**Vandet**

**Akvariestørrelse:** 150

**Niveau:** Øvre zone

**Vandcirkulation:** Svag

**Min. pH:** 5,5

**Max. pH:** 7,5

**Min. dH:** 6

**Max. dH:** 18

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:** Medium

### **Formering**

**Ynglebiologi:** Bygger skumrede, æglægger. Hunnen lægger mellem 400-800 æg i skumreden, ved endt leg jager hannen sin mage væk og passer både æg og yngel, indtil de efter ca. 2-3 dage er fritsvømmende.

**Drægtighed:** Æggene klækkes efter et døgn tid.

**Leg:** Hannen lokker hunnen op under reden og omfavner hunnen, hvorpå hun smider æggene og hannen befrugter dem i samme øjeblik. Æggene indeholder en olie der gør at de stiger opad, hvor de bliver samlet sammen og spyttet ind i skumreden. Dette gentager sig indtil hunnen ikke har mere at byde på, så jager hannen hende væk.

**Øvrigt omkring opdræt og yngel:** Efter 2-3 dage fodres yngel op med infusorier de første 2 uger og derefter nyklækkede/afskallede Artemia. Man kan også bruge knust flagefoder. Efter ca. 3-4 uger bliver deres labyrint (åndedrætsorgan) udviklet og lav vandstand er derfor nødvendig, for at de kan nå at komme op til overfladen og trække atmosfærisk luft. Hav en luftsten tilsluttet akvariet for at bryde evt. "hinde" der kommer på overfladen. 1/4 vandskift hver uge.

### **Øvrige oplysninger**

**Generel  
beskrivelse**

**Forfatter:** Søren



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)