

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn): Corydoras paleatus

Populærnavn (dansk navn): Plettet pansermalle

Familie (latin): Callichthyidae

Type: Ferskvand, Pansermaller

Opdager (beskrevet af): Jenyns, 1842

Førstegangsoodræt i DK:

Levested

Verdensdel: Sydamerika.

Biotop (beskrivelse af regionen): Klartvandsbiotoper med lavt, køligt vand. Sten- og sandbund, lejlighedsvist planter, rødder og grene.

Udseende

Størrelse: 7 cm.

Form: Solid, kantet krop med stort hoved med nedadrettet mund. Rygfinne og brystfinner er trekantede med stive finnestråler til forsvar mod rovdyr. Halefinnen er kløvet.

Farve: Se billeder.

Kønsforskel: Hunnen er større og mere buttet.

Varianter: Forskellige kulturformer som fx high-fin, slørhale og albino, og derudover en vis naturlig variation.

Behov

Dekorationer: Bund af sand eller afrundet grus, så fisken ikke ødelægger sine føletråde, når den roder efter mad. Lidt skjul i form af plantetykninger, trærødder o.lign.

Adfærd: Fredelig fisk, som er velegnet til såvel selskabsakvarier som biotopakvarier. Kan holdes stort set sammen med alle fisk, bortset fra større, aggressive cichlider, som gør krav på bundarealet som deres territorium.

Social: Trives bedst i flokke på fem eller derover. Pansermaller stimer uanset om de tilhører samme art eller ej.

Foder: Alt, som synker til bunds. Pellets, mallerpiller, frostfoder, rejer og tubifex.

Vandet

Akvariestørrelse: 50

Niveau: Bund zone

Vandcirkulation: Middel

Min. pH: 6,0

Max. pH: 7,0

Min. dH: 5

Max. dH: 15

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning: Medium

Formering

Ynglebiologi: Hæfteleger uden yngelpleje. Denne art yngler ofte i selskabsakvariet, ofte triggeret af rigeligt foder og pludseligt, koldt vandskift. For at sikre at æg og unger overlever, kan man flytte en flok med flere hanner end hunner til et fx 20 liters opdrætsakvarium. Fiskene fedes op med fx røde myggelarver. Når hunnerne har sat rogn (blevet så runde om bugen at de ikke længere kan støtte på deres brystfinner), simulerer man regntid og skifter 50% vand med frisk, koldt vand, så der kommer et betydeligt temperaturfald.

Drægtighed: Æggene klækker efter to dage. Larverne er fritsvømmende efter yderligere fire dage.

Leg: Legen foregår, som ved andre fra slægten, ved at fiskene indtager T-stilling og æggene hæftes på ethvert tænkeligt substrat. Hvordan æggene befrugtes er et mysterium blandt Corydoras-flok, da det ikke er observeret, at hannerne ”dupper” gattet mod hvert enkelt æg, som det er tilfældigt hos fx cichliden. Et bud er, at hannerne simpelthen frigiver sæden ud i vandet og æggene befrugtes ved tilfældighed. En anden teori går på, at hunnerne på en eller anden måde indtager en sædpakke fra hannen og via en mekanisme i kroppen (muligvis den som også gør Corydoras i stand til at trække luft fra overfladen) selv sørger for befrugtning af æggene.

Øvrigt omkring opdræt og yngel: Ungerne vokser hurtigt, og opfodres nemt på klækket eller afskallet artemia, mallepiller og hakkede myg.

Øvrige oplysninger

Generel beskrivelse Denne art forekommer at være mere livlig, robust og farvestrålende i køligere vand. Hører til blandt en af de nemmeste og kønneste Corydoras, og er derfor et godt valg for begyndere.

Forfatter: Elisabeth Schrøder



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

